

普陀灵韵

——海岛珍稀物种撷趣

21

陆生昆虫

普陀区共调查记录到陆生昆虫896种,隶属于18目186科694属。鳞翅目昆虫种类最多,有36科236属294种;其次是鞘翅目,有30科133属174种;其余昆虫种类较多的包括半翅目18科63属75种,直翅目20科53属70种。调查发现国家二级重点保护野生动物2种:拉步甲和金裳凤蝶。



紫色型拉布甲
——舟山特有的海岛色型

拉步甲

步甲科 大步甲属
保护级别 国家二级重点保护野生动物
濒危等级 未予评估(NE)
形态特征 体长34-39毫米,体宽11-16毫米。头部、前胸背板绿色带金黄或金红光泽,鞘翅绿色,侧缘及缘折金绿色,瘤突黑色,前胸背板有时全部深绿色,鞘翅有时蓝绿色或蓝紫色。鞘翅近椭圆形,背隆肩圆,后部明显收狭,末端形成尾突。
生境特点 夜晚捕食鳞翅目、双翅目昆虫及蜗牛、蛞蝓等小型软体动物,也食植物性食物;白天潜藏于枯枝落叶、松土或杂草丛中。
发现地点 走马塘岛、朱家尖岛、舟山本岛、砚瓦岛、虾峙岛、桃花岛、普陀山岛、六横岛。



一般色型拉布甲



宽尾凤蝶

凤蝶科 宽尾凤蝶属
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 未予评估(NE)
形态特征 翅展115-130毫米。体、翅黑色,翅面散生黄色鳞片,脉纹清晰,翅脉两侧及后翅基部呈灰白或灰黄色;前翅前缘色深,中室内有数条黑色纵纹。后翅外缘波状,波谷红色,外缘区有6个弯月形红色斑纹,尾突宽大呈靴形,是本种的主要特征;有的中室端半部呈白色,称为“白斑型”。
生境特点 一般在林缘及开阔地活动。喜欢滑翔飞行,飞行时后翅不扇动。喜欢访花与吸水。幼虫以樟科檫树,木兰科鹅掌楸、厚朴等植物为食。
发现地点 朱家尖岛、舟山本岛、砚瓦岛、桃花岛。



箭环蝶

蛱蝶科 箭环蝶属
保护级别 无
濒危等级 未予评估(NE)
形态特征 翅展褐黄色,体大型,前翅正面黄褐色,前后翅周边有一圈箭簇状黑斑,也象矛头,又似小鱼图案,故名。翅的腹面中域有一纵列红褐色圆形斑(眼斑),中心米色,圆斑围为深褐色边缘,圆斑内侧有二暗褐色线纹,勾勒出近似人形的侧影图。
生境特点 森林蝶类,多发生于丘陵地带,在树荫、竹丛中穿梭飞行,常于黎明或傍晚于幽深竹林小道上出现。大发生时常常几十上百只聚集腐叶烂果上。
发现地点 朱家尖岛、舟山本岛、蚂蚁岛、六横岛、柴山岛。



虎斑蝶

蛱蝶科 斑蝶属
保护级别 无
濒危等级 未予评估(NE)
形态特征 翅展85毫米左右。翅膀腹面鲜橙色,翅脉和翅边缘黑色,边缘上有两行小白点,前翅端黑褐色,翅端有大的黑色区,区内有一条由5个相邻的白色棒状白斑组成的白色斜带。附近有几个小白点,外缘有2列小白点。后翅外缘内有2列白色小点,内侧有时不明显。雄蝶的后翅有椭圆形香鳞袋。
生境特点 常见于湿地公园内,雄性虎斑蝶经常伏于吊裙草上吸食汁液,南亚热带和热带地区常见,但较少被养殖。
发现地点 朱家尖岛、虾峙岛、桃花岛、六横岛。

(本版内容来源:《普陀灵韵—海岛珍稀物种撷趣》一书)

